

### **QUOI FAIRE SI MON ENFANT PRÉSENTE DES SYMPTÔMES?**

#### Avant le départ de la maison, mon enfant présente... Au moins DEUX des symptômes suivants : UN des symptômes suivants : Fièvre Nez qui coule ou congestion nasale (nez bouché) de cause 5 ans et moins : de 38.5°C (101.3°F) et plus inconnue (température rectale) Mal de tête 6 ans et plus : de 38.1°C (100.6°F) et plus Fatigue intense (température buccale) Douleurs musculaires généralisées (non liées à un effort Toux (nouvelle ou aggravée) physique) Perte soudaine de l'odorat sans congestion nasale, Diarrhée avec ou sans perte du goût Nausées ou vomissements Essoufflement, difficulté à respirer Douleur abdominale Mal de gorge Perte d'appétit importante

### J'AVISE L'ÉCOLE.

### MON ENFANT SYMPTOMATIQUE DOIT S'ISOLER ET PASSER UN TEST RAPIDE ou UN AUTOTEST. \*



### Résultat négatif

## En l'absence de fièvre, mon enfant peut poursuivre ses

- activités et doit :Porter un masque (sauf pour le préscolaire) ;
  - Respecter la distanciation de 2 mètres (si possible);
  - Refaire un second test rapide 24 h à 36 h plus tard.

### En cas de fièvre (peu importe la raison), mon enfant doit :

 S'isoler jusqu'à 24 h après la fin de la fièvre (sans avoir pris de médicament contre la fièvre);

Retour de l'enfant à l'école.

• Surveiller ses symptômes.


Résultat positif
Mon enfant est isolé = 5 jours

# Mon enfant peut retourner en classe après 5 jours si les conditions suivantes sont respectées :

- S'il est adéquatement vacciné \*
- Diminution des symptômes ET
- 24 heures sans fièvre (sans avoir pris un médicament contre la fièvre)

#### S'il n'est pas adéquatement vacciné, mon enfant doit :

• Obtenir un résultat négatif à un test rapide ou à un autotest au jour 5 de son isolement.



→ Port du masque obligatoire pour 5 jours (sauf au préscolaire) et respect de la distanciation de 2 mètres, si possible.

Si une des conditions n'est pas respectée = L'isolement de mon enfant se poursuit pour 5 jours supplémentaires.

### \* Remarques :

- En cas d'impossibilité ou de refus de passer un test rapide ou un autotest, mon enfant est considéré comme une personne atteinte de la COVID-19. Il devra être isolé 5 jours et poursuivre l'isolement 5 jours supplémentaires à moins qu'il n'obtienne un résultat négatif à un test rapide ou un autotest au 5<sup>e</sup> jour.
- Une personne qui doit poursuivre son isolement 5 jours supplémentaires après un résultat positif au 5<sup>e</sup> jour pourrait mettre fin à son isolement à partir du 6<sup>e</sup> jour si elle respecte toutes les conditions suivantes : ses symptômes diminuent <u>ET</u> elle n'a plus de fièvre depuis 24 heures (sans avoir pris de médicament contre la fièvre) <u>ET</u> elle obtient deux résultats négatifs à deux tests rapides ou autotests réalisés à plus de 24 heures et moins de 36 heures d'intervalle.
- Une personne adéquatement vaccinée <u>OU</u> qui a eu la COVID qui est en <u>contact domiciliaire</u> avec un cas positif <u>ET</u> qui est asymptomatique n'a pas à s'isoler et doit surveiller l'apparition de symptômes, porter un masque et pratiquer la distanciation de 2 mètres (si possible) pour les 10 jours suivant le dernier contact avec le cas. Dans le cas contraire, elle doit s'isoler 5 jours.
- Une personne qui a déjà eu la COVID-19 est considérée adéquatement protégée pour une durée de 2 mois et n'a pas à s'isoler ni à faire de test de dépistage si elle développe des symptômes s'apparentant à ceux de la COVID. Toutefois, <u>SI</u> elle fait de la fièvre, peu importe la cause de celle-ci, elle doit s'isoler durant 24 heures après la fin de la fièvre (sans prise de médicament).